

Sortenbeschreibungen zur Streuobstaktion 2003

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderheiten	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Apfel							
Brettacher	großfrüchtig, saftig herb gewürzt mit erfrischender Säure	stark, breite Krone, mittelfrüher Ertrag,	Zufallssämling nicht für nasse Böden geeignet Tafel- und Wirtschaftsapfel	wenig anfällig	Mitte Oktober	ab Februar	bis Mai
Danzinger Kantapfel	mittelgroß, saftig, leicht gewürzt, rotschalig	kräftig	Frosthärte	Wenig anfällig	Ende September		bis Ende November
Gelber Edelapfel	zitronengelb, groß, feinwürzig, kräftige Säure	kräftig	Seit 1800, Back- und Dessertapfel	Wenig anfällig	Mitte September		bis Januar
Florina	Mittel, leicht süß, aromatisch, rotbackig	stark		Schorfresistent Tolerant gegenüber Feuerbrand	Mitte Oktober	Ab November	bis Januar
Kaiser Wilhelm	groß, knackig und saftig, grüngelb bis rot	sehr wüchsig	Tafel- und Mostapfel	widerstandsfähig	Anfang Oktober		bis März
Ontario	frischsauerlich, groß	mittel	Tafel- und Wirtschaftsapfel	Wenig anfällig	Ende Oktober	ab Dezember	bis Mai
Prinz Albrecht (von Preußen)	mittelgroß, rötlich, Fruchtfleisch fein süß-sauerlich	mittelstark, früher Ertrag	1865 als Sämling Tafel- und Wirtschaftsapfel	widerstandsfähig	Ende September	Anf. November	bis Januar
Remo	Mittelgroß, weinrot	lockere Krone	Mostapfel, hoher regelmäßiger Ertrag	Resistent gegen Feuerbrand, Schorf und Mehltau	Anfang September		bis Oktober
Rewena	mittelgroß, fest, aromatisch	Mittelstark, früher Ertrag	Neuzüchtung	Schorfresistent	Anf. Oktober	Ab November	bis Februar

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderheiten	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Rheinischer Bohnapfel	eiwalzenförmige Frucht, zuerst geringer, später ausreichender Zuckergehalt, Mostapfel	starkwachsend, reichtragend	seit 1800 Wirtschaftsapfel schlechter Pollenspender	widerstandsfähig	Ende Oktober	ab Januar	bis in den Sommer
Roter Eiserapfel	rundlich kegelförmig, Farbe unterschiedlich, mäßig saftig	kräftig, späte Blüte, schlechter Pollenspender, sehr später Ertrag, dann aber hoch	seit dem 16 Jhr. Wirtschaftsapfel	wenig empfindlich	Ende Oktober	ab Dezember	bis in den Sommer
Schöner von Boskoop	große berostete Frucht, würzige weinsäuerlich Geschmack	empfindliche Blüte (Witterung)	1856 in Boskoop in Holland entstanden, Tafel- und Wirtschaftsapfel	etwas schorfempfindlich	Mitte Oktober	ab Mitte Dezember	bis April
Topaz	Mittel, rot geflammt, sehr saftig, aromatisch	Mittelstark, Auslichtung notwendig	Neuzüchtung, Tafelapfel und Wirtschaftsapfel	Schorfresistent, widerstandsfähig	Anfang Oktober	Ab November	bis März
Wiltshire	gelblich mit leichten roten Streifen, saftig leicht süß	stark, regelmäßiger hoher Ertrag	eine Hauptsorte in Bayern, guter Pollenspender Wirtschaftsapfel, Mostapfel	widerstandsfähig	Mitte Oktober	ab November	bis Dezember
Winterrambur	groß, saftig weinsäuerlich	stark, breit, spät einsetzender Ertrag	Wirtschaftsapfel	widerstandsfähig	Mitte Oktober	ab Dezember	bis April

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderheiten	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Birnen							
Conference	Mittelgroß, gelbgrün, saftig, süß, schmelzend	Mittelstark, aufrecht		Beobachtung hinsichtlich Feuerbrand nötig	Mitte September	Oktober	
Tongern	Mittel, rauh, saftig, mäßig süß	schwach		Beobachtung hinsichtlich Feuerbrand nötig	Ende September	Oktober	Bis November
Madame Verte	Klein, braun bestet, würzig		Für kühle Regionen geeignet		Ende Oktober	Ab Dezember	
Schweizer Wasserbirne	Mittelgroß, eiförmig	Sehr stark	Mostbirne		Ende September	Sofort für 2-3 Wochen	
Steinobst							
Ludwigs Frühe Sauerkirsche	Farbloser Saft, hellrote Fruchtschale, süßsauerlich	mittelstark	Amarelle	Moniliafest und frosthart	3. Kirschenwoche		
Gerema Sauerkirsche	Schwarzrot, Stein löst sich mäßig	schwach	Neue Sorte	Wenig anfällig für Monilia, Kirsche für die Verarbeitung	8.Kirschenwoche		
Zwetschge	Liefersorte noch nicht bekannt				September Oktober		

zusammengestellt Mai 2003, Sortiment der Streuobstaktion , Kreisfachberatung Weilheim-Schongau

Sortenbeschreibungen zur Streuobstaktion 2005

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Apfel							
Brettacher	großfrüchtig, saftig herb gewürzt mit erfrischender Säure	stark, breite Krone, mittel-früher Ertrag	Zufallssämling nicht für nasse Böden geeignet Tafel- und Wirtschaftsapfel	wenig anfällig	Mitte Oktober	ab Februar	bis Mai
Croncels	groß, hellgelb süßweinig Aroma	mittelstark	windfest, guter Pollenspender	eventuell Mehltau	Anf. September	ab September	bis Oktober
Danzinger Kantapfel	mittelgroß, saftig, leicht gewürzt, rotschalig	kräftig	Frosthärte	wenig anfällig	Ende September	Oktober	bis Ende November
Dülmener Rosenapfel	groß, gelb mit roter Deckfarbe fein gewürzt	mittel	1870 Sämling von Gravensteiner, Alternanz	robust	Ende September	September	bis November
Florina	mittel, leicht süß, aromatisch, rotbackig	stark	Neuzüchtung	Schorfresistent Tolerant gegenüber Feuerbrand	Mitte Oktober	Ab November	bis Januar
Gelber Edelapfel	zitronengelb, groß, feinwürzig, kräftige Säure	kräftig	Seit 1800, Back- und Dessertapfel	Wenig anfällig	Mitte September	September	bis Januar
Grahams Jubiläumsapfel	groß, gelb, feinsäuerlich	mittel	späte Blüte, regelmäßiger Ertrag	robust	September	Oktober	bis November
Relinda	rot, säuerlich	kräftig	Neuzüchtung	robust	Anf. Oktober	Oktober	bis März
Rewena	mittelgroß, fest, aromatisch	Mittelstark, früher Ertrag	Neuzüchtung	Schorfresistent	Anf. Oktober	Ab November	bis Februar
Roter Bellefleur	mittel, gelblichgrün, Sonnenseite rot, saftig	schwach	Tafel- und Wirtschaftsapfel, späte Blüte, z.B. Kombination mit Grahams Jubiläumsapfel	sehr widerstandsfähig	Oktober	ab Dezember	bis Mai
Roter Boskoop	groß, rotschalig, saftig angenehm säuerlich	stark, später Ertrag, kein Pollenspender	Wirtschaftsapfel	schorfanfällig	Mitte Oktober	Mitte Dezember	April
Roter Eiserapfel	rundlich kegelförmig, Farbe unterschiedlich, mäßig saftig	kräftig, späte Blüte, schlechter Pollenspender, sehr später Ertrag, dann aber hoch	seit dem 16 Jhr. Wirtschaftsapfel	wenig empfindlich	Ende Oktober	ab Dezember	bis in den Sommer
Rote Sternrenette	mittel, rot	mittelgroß	seit 1830 Weihnachtsapfel	robust	Oktober	Ende November	bis Februar
Schöner aus Herrnhut	mittel, rot geflammt, saftig würzig	mittelstark	seit 1900	robust	Ende September	Oktober	bis Februar

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Wiltshire	gelblich mit leichten roten Streifen, saftig leicht süß	stark, regelmäßiger hoher Ertrag	eine Hauptsorte in Bayern, guter Pollenspender Wirtschaftsapfel, Mostapfel	widerstandsfähig	Mitte Oktober	ab November	bis Dezember
Birnen							
Doppelte Philippsbirne	groß, saftreich	stark	seit 1800	robust	September	Ende September	bis Oktober
Grüne Jagdbirne	klein	stark	Mostbirne	robust	Anf. November	November	bis Januar
Gute Graue	klein, grün, berostet, saftig zimtartig gewürzt	später Ertrag, breitkronig	seit dem 18 Jhr., Tafelbirne, Wirtschaftsf Frucht, Dörrfrucht	ziemlich widerstandsfähig	Anf. September	Mitte September	2 Wochen
Josephine von Mecheln	klein, gedrunge n gelbgrün, guter Geschmack	klein, breit	Tafel- und Kompottbirne, Alternanz	robust	Ende Oktober	Dezember	bis März
Madame Verte	Klein, braun berostet, würzig		Für kühle Regionen geeignet		Ende Oktober	Ab Dezember	
Steinobst							
Hanita	Blaue Pflaume, guter Geschmack, steinlösend	mittel	Neuzüchtung, selbstfruchtbar Frischverzehr und Verarbeitung	robust, Scharka anfällig beim Blatt	Anf. September		
Wangenheimer Frühzwetschge	mittelgroß, süß, würzig, steinlösend	starke breite Krone	1837 gefunden, vielseitige Verwendung, auch Dörrfrucht, selbstfruchtbar	robust, Scharka anfällig	Ende August		
Sunburst - Süßkirsche	rot, Frischverzehr	stark	selbstfruchtbar	nur für geschützte Stelle mit durchlässigem Boden	4.-5. Kirschenwoche		

zusammengestellt Juni 2005, Sortiment der Streuobstaktion , Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau

Sortenbeschreibungen zur Streuobstaktion 2007

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Apfel							
Berner Rosenapfel	mittelgroß, Fruchtschale rot, saftig, schwach-aromatisch	mittelstark, früher Ertrag, regelmäßig	1888 in der Schweiz als Sämling gefunden Wirtschaftsapfel	etwas schorfanfällig	Ende September	ab November	bis Dezember
Champagner Renette	Klein, weinsäuerlich	Schwachwachsend, Hausgarten geeignet	Sehr alte Sorte, geringer Schnittaufwand	Krebsanfällig auf nassen Böden	Ende Oktober	ab Dezember	bis April
Croncels	groß, hellgelb süßweinig Aroma	Mittelstark Halbstamm	windfest, guter Pollenspender	eventuell Mehltau	Anf. September	ab September	bis Oktober
Danzinger Kantapfel	mittelgroß, saftig, leicht gewürzt, rotschalig	kräftig	Frosthärte	wenig anfällig	Ende September	Oktober	bis Ende November
Florina	mittel, leicht süß, aromatisch, rotbackig	Stark Halbstamm	Neuzüchtung	Schorfresistent Tolerant gegenüber Feuerbrand	Mitte Oktober	Ab November	bis Januar
Geheimrat Oldenburg	Würzige Geschmack Gelb mit rot	mittelstark	Tafel- und Wirtschaftsorte	Nur für warme Lagen	September	September	bis Dezember
Ingrid Marie	Rot, guter Geschmack	Kräftig, trägt früh Halbstamm	Tafelapfel	Gute Pflege notwendig	September	Oktober	bis Januar
Jakob Lebel	Angenehm säuerlich, groß, gelb leicht gerätet	kräftig	Wirtschaft- und Mostapfel	anspruchlos	September	Oktober	bis Dezember
Kaiser Wilhelm	groß, knackig und saftig, grüngelb bis rot	sehr wüchsig	Tafel- und Mostapfel	widerstandsfähig	Anfang Oktober		bis März
Krügers Dickstiel	angenehmes Aroma, grüngelb, rot gestreift	Schwachwachsend, Hausgarten geeignet	Tafelapfel	widerstandsfähig	Oktober	November	Bis Januar
Maunzen	gelb-grün	stark	Mostapfel für raue Lagen	widerstandsfähig	Oktober	ab Dezember	bis März
Rubinola	Gelb, orange gestreift aromatisch	mittelstark	Neuzüchtung Tafel- und Wirtschaftsapfel	widerstandsfähig	Oktober	Oktober	bis März
Schöner aus Herrnhut	mittel, rot geflammt, saftig würzig	mittelstark	seit 1900	robust	Ende September	Oktober	bis Februar
Topaz	Mittel, rot geflammt, sehr saftig, aromatisch	Mittelstark, Auslichtung notwendig	Neuzüchtung, Tafelapfel und Wirtschaftsapfel	Schorfresistent, widerstandsfähig	Anfang Oktober	Ab November	bis März
Birnen							
Doppelte Philippsbirne	groß, saftreich	stark	seit 1800	robust	September	Ende September	bis Oktober
Gute Graue	klein, grün, berostet, saftig zimtartig gewürzt	später Ertrag, breitkronig	seit dem 18 Jhr., Tafelbirne, Wirtschaftsf Frucht, Dörrfrucht	ziemlich widerstandsfähig	Anf. September	Mitte September	2 Wochen
Stuttgarter Geißhirtle	Mittelgroß, saftreich	mittel	Vereinzelt gute Erfahrungen im Landkreis	robust	August	August	bis September
Madame Verte	Klein, braun berostet, würzig	Halbstamm	Für kühle Regionen geeignet		Ende Oktober	Ab Dezember	Januar

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Steinobst - Zwetschge und Mirabelle							
Hanita	Blaue Pflaume, guter Geschmack, steinlösend	mittel	Neuzüchtung, selbstfruchtbar Frischverzehr und Verarbeitung	robust, Scharka anfällig beim Blatt	Anf. September		
Wangenheimer Frühzwetschge	mittelgroß, süß, würzig, steinlösend	starke breite Krone	1837 gefunden, vielseitige Verwendung, auch Dörrfrucht, selbstfruchtbar	robust, Scharka anfällig	Ende August		
Katinka	Mittel, sehr	Halbstamm , breitwüchsig, locker	Selbstfruchtbar, Frischverzehr und Kuchenbelag	Robust, Scharka anfällig - nur Blatt	Anf. August		
Nancy Mirabelle	klein, fest, hellgelb, bei Regen platzempfindlich	stark, später breitkronig	wertvollste Mirabellensorte, hoher Ertrag	kaum	Ende August		

zusammengestellt Mai 2007, Sortiment der Streuobstaktion , Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau

Sortenbeschreibungen zur Streuobstaktion 2009

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Äpfel							
Wondernot	mittelgroß, flachrund, rot gefärbt	mittelstark, Halbstamm	Frühsorte für den Frischverzehr	widerstandsfähig	Mitte August	Mitte August	3 Wochen
Releika	klein, intensiv rot, süß, aromatisch	schwach, Halbstamm	Zierwert, für den Hausgarten geeignet	resistent gegen Schorf, Bakterienbrand	Mitte September	Ende September bis November	bis Dezember
Remo	mittelgroß, gelbgrün mit purpurroter Deckfarbe	mittelstark, Halbstamm	für die Verarbeitung geeignet	resistent gegen Schorf, Mehltau, Feuerbrand	Mitte September	September bis Oktober	bis Ende November
Jakob Lebel	angenehm säuerlich, groß, gelb, leicht gerötet	kräftig	Wirtschafts- und Mostapfel	anspruchslos	September	Oktober	bis Dezember
Berner Rosenapfel	mittelgroß, Fruchtschale rot, saftig, schwach-aromatisch	mittelstark, früher Ertrag, regelmäßig	1888 in der Schweiz als Sämling gefunden,	etwas schorfanfällig	Ende September	ab November	bis Dezember
Danzinger Kantapfel	mittelgroß, saftig, leicht gewürzt, rotschalig	kräftig	Frosthärte	wenig anfällig	Ende September	Oktober	bis Ende November
Schöner aus Herrnhut	mittel, rot geflammt, saftig würzig	mittelstark	seit 1900	robust, sehr frosthart	Ende September	Oktober	bis Februar
Kaiser Wilhelm	groß, knackig und saftig, grüngelb bis rot	sehr wüchsig	Tafel- und Mostapfel, hohe Erträge	widerstandsfähig	Anfang Oktober	ab Dezember	bis März
Topaz	mittel, rot geflammt, sehr saftig, aromatisch	mittelstark, Auslichtung notwendig	Neuzüchtung, Tafel- und Wirtschaftsapfel	schorffresistent, widerstandsfähig	Anfang Oktober	ab November	bis März
Hilde	grün-gelb, rot gestreift, ungleichmäßige Form	schwach, kleine Krone	Wirtschafts- und Mostapfel	robust, keine schweren und nassen Böden	Anfang bis Mitte Oktober	ab Dezember	bis April
Florina	mittel, leicht süß, aromatisch, rotbackig	stark	Neuzüchtung	schorffresistent, tolerant gegenüber Feuerbrand	Mitte Oktober	ab November	bis Januar
Schöner aus Nordhausen	mittelgroß, fettig-grün, später goldgelb	kräftig	Tafel- und Wirtschaftsapfel	widerstandsfähig gegen Frost	Mitte Oktober	Januar bis April	bis April, gute Lagerfähigkeit
Maunzen	gelb-grün	stark	Mostapfel für raue Lagen	widerstandsfähig	Oktober	ab Dezember	bis März
Rubinola	gelb, orange gestreift aromatisch	mittelstark	Neuzüchtung Tafel- und Wirtschaftsapfel	widerstandsfähig	Oktober	Oktober	bis März
Walnüsse							
Geisenheim Nr. 139	mittelgroß, glattschalig, hellgelbe Nuss	mittelstark, geschlossene Krone, 70 m ² Platzbedarf	selbstfruchtbar, reiche, regelmäßige Fruchtbarkeit	kaum spätfrostgefährdet, für alle Lagen geeignet	Ende September	Ende September bis Anfang Oktober	gut getrocknete und luftig gelagerte Nüsse können über
Weinsberg 1	groß, sehr dünne Schale, wohlschmeckend	schwacher Wuchs, breite Krone, 50m ² Platzbedarf	regelmäßige Düngung und Bodenpflege	kaum spätfrostgefährdet, nur für gute Böden mit ausreichender Feuchtigkeit	Ende September	Ende September bis Anfang Oktober	mehrere Monate gelagert werden

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Steinobst Zwetschge und Mirabelle							
Ersinger Frühzwetschge	groß, edler Geschmack	mittelstark	frühe und reiche Erträge	scharkatolerant	Ende Juli bis Anfang August	August	bei 1 °C bis zu 6 Wochen
The Czar	große und blaue Pflaume, festes Fleisch, steinlösend	mittelstark	reiche und regelmäßige Erträge	geringe Anfälligkeit für Scharka	Anfang August	August	bei 1 °C bis zu 6 Wochen
Elena	mittelgroß, dunkelblau, gut steinlösend, süß	mittelstark, Halbstamm	Frischverzehr und Kuchenbelag	wenig krankheitsanfällig, scharkatolerant	Anfang Oktober	Oktober	bei 1 °C bis zu 6 Wochen
Bellamira (Mirabelle)	rund, goldgelb, fest, saftig, steinlösend	mittelstark	sehr früh einsetzender und hoher Ertrag	scharkatolerant, platzfest	Mitte August	August	bei 1 °C bis zu 6 Wochen
Birnen							
Harrow Delight	mittel bis lang, gelbgrün, saftig, süß, schmelzend	schwach, gut verzweigt	für Hausgarten und Erwerbsanbau, direkter Verzehr	robust, feuerbrandresistent	Anfang August	Mitte bis Ende August	bis September
Harrow Sweet	mittelgroß, glatt, goldgelb, leicht rötlich	schwach bis mittelstark	regelmäßige und hohe Erträge	robust, feuerbrandresistent	Anfang bis Mitte September	September	im Naturlager bis Oktober, im Kühllager bis Dezember
Uta	mittel bis groß, goldbronzefarben berostet, saftig, süß	schwach bis mittelstark	vielseitig verwendbar	gering anfällig für Feuerbrand	Mitte Oktober	Oktober	im Kühllager bis Januar/Februar,
Novembra	gelb aufgehellt, festfleischig, saftig süß	mittelstark, Halbstamm	sehr robuste Sorte	robust gegen Pilzkrankheiten	Oktober	ab Oktober	bis Ende Dezember
Quitten							
Cydora Robusta	leuchtend gelb, süß-saures Aroma	mittelstark	hohe und frühe Fruchtbarkeit, für alle Verarbeitungsarten geeignet	tolerant gegenüber Feuerbrand, mehlauresistent, blattfleckenresistent, sehr robust	Anfang bis Mitte Oktober	Oktober bis November	bis Dezember bei 0 - 2 °C, nicht in der Nähe von anderen Obstsorten lagern

zusammengestellt Mai 2009, Sortiment der Streuobstaktion , Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau

Hinweis zum Thema Feuerbrand in Streuobstanlagen:

Es wurden bewußt Sorten herausgesucht, die weniger anfällig für Feuerbrand sind. Eine Erkrankung des Baumes ist jedoch nie ganz auszuschließen.

Trotz der zunehmenden Ausbreitung muss das Ziel sein, den Streuobstanbau zu erhalten und auszubauen. Der landschaftliche Nutzen ist sehr viel größer als die Verbreitung.

Sortenbeschreibungen zur Streuobstaktion 2011

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Äpfel							
Sirius	gelbschalig, sehr guter Geschmack, mittelgroße Frucht	mittelstark, Halbstamm	Neuzüchtung , geringe Standortansprüche	Schorfresistenz, wenig anfällig für Mehltau	Anfang Oktober	Mitte Oktober	gute Lagerfähigkeit, bis Februar
Releika	klein, intensiv rot, süß, aromatisch	schwach, Halbstamm	Zierwert, für den Hausgarten geeignet	resistent gegen Schorf, Bakterienbrand	Mitte September	Ende September bis November	bis Dezember
Remo	mittelgroß, gelbgrün mit purpurroter Deckfarbe	mittelstark, Halbstamm	für die Verarbeitung geeignet, Mostapfel	resistent gegen Schorf, Mehltau, Feuerbrand	Mitte September	September bis Oktober	bis Ende November
Jakob Fischer	groß, unregelmäßige Form, flächig rot, weißes Fruchtfleisch	sehr starker, gesunder Wuchs, breite, lockere Krone	gelegentliche Auslichtung notwendig wegen des starken Wuchses, sehr guter Tafelapfel	Widerstand gegen Feuerbrand, auf schweren und kalten Böden krebsanfällig	ab Mitte August	ab September	bis November, dann mehlig werdend
Zuccalmaglios	klein bis mittel, gelbgrün, kräftiger Duft, feines Aroma	hochkugelige Krone, schwacher Wuchs, Verjüngung ist von Vorteil	für den Frischverzehr, Spitzensorte bei der richtigen Pflege, Spätsorte	gering anfällig für Feuerbrand und Schorf	ab Anfang Oktober, mehrmaliges Durchpflücken ist anzuraten	ab Oktober	im kühlen Naturlager bis Februar/März haltbar
Danzinger Kantapfel	mittelgroß, saftig, leicht gewürzt, rotschalig	anfangs kräftig, später mittelstarke Verzweigung -> Auslichtung	vollkommene Frosthärte	wenig anfällig	Ende September	Oktober	bis Ende November
Schöner aus Herrnhut	mittel, rot geflammt, saftig würzig	mittelstark, Krone hochkugelig, frosthartes Holz	seit 1900, sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel	robust, sehr frosthart, ziemlich widerstandsfähig	ab Ende September	ab Oktober	bis Februar
Kaiser Wilhelm	groß, knackig und saftig, grüngelb bis rot	sehr wüchsig	Tafel- und Mostapfel, hohe Erträge	widerstandsfähig	Anfang Oktober	ab Dezember	bis März
Topaz	mittel, rot geflammt, sehr saftig, aromatisch	mittelstark, Auslichtung notwendig	Tafel- und Wirtschaftsapfel	schorfresistent, widerstandsfähig	Anfang Oktober	ab November	bis März
Gravensteiner	mittelgroß, gelb bis rötlich geflammt, saftiges gelblich weißes Fruchtfleisch	sehr kräftiger Wuchs, mäßiger Aufbauschnitt notwendig	Früchte reifen nicht gleichzeitig, Sorte für den Garten	etwas schorf- und mehltuanfällig	ab Anfang September	ab Anfang Oktober	bis Ende Dezember
Schöner aus Wiltshire	mittelgroß, grünlichgelb, duftend, süßaromatisch	erst starker Wuchs, später mittelstark, guter Pollenspender, kann sehr alt werden	auch für raue Höhenlagen und regenreiche Gebiete geeignet	kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge	ab Mitte September	ab November	bis Dezember
Schöner von Nordhausen	mittelgroß, fettig-grün, später goldgelb	kräftig	Tafel- und Wirtschaftsapfel	widerstandsfähig gegen Frost	Mitte Oktober	Januar bis April	bis April, gute Lagerfähigkeit
Bohnapfel	klein bis mittelgroß, grün bis gelbgrün, saftig säuerlich	mittelstark, ausreichende Verzweigung, im Holz frosthart	für Streuobstflächen, lange haltbare - für Verwertung	gering Feuerbrand u. Schorf, ohne Mehltau u. Stippe, robust	Ernte erst nach einigen Jahren, ab Mitte Oktober	ab Februar, Früchte hängen windfest am Baum	gut lagerfähig, bis Mai
Grahams Jubiläumsapfel	gelbgrün, nur leicht gerötet, weniger süß	mittelstark, im Holz frosthart u. gesund	„Bäckerapfel“, Stücke bleiben fest	widerstandsfähig gegen Frost u. Schorf	ab Mitte September	ab Ende September	bis Ende Oktober

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Birnen							
Harrow Sweet	mittelgroß, glatt, gelblich grün, leicht rötlich, saftig, süßaromatisch	schwach bis mittelstark, Schnitt für die Trieberneuerung, um Erschöpfung zu vermeiden	regelmäßige und hohe Erträge, gute Böden und Lagen	robust, feuerbrandresistent, gering anfällig für Schorf u. Mehltau	Anfang bis Mitte September	September	im Naturlager bis Oktober
Stuttgarter Geißhirtle	klein bis mittelgroß, gelblich, trüb gerötet, sehr süß und zimtartig gewürzt	mittelstark und sehr harmonisch	sehr gute Tafelbirne	widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge	Ende August	Ende August	1 Woche haltbar
Gellerts Butterbirne	mittelgroß, abgestumpft kegelförmig, gelb, Fruchtfleisch weiß, saftig, gutes Aroma, vielseitig verwertbar	starker Wuchs, später schwach, Schnitt nach der Ernte zielt auf bessere Verzweigung der unteren Baumregion	auch für höhere Lagen, jedoch windgeschützt, nicht für trockenen, kalten Boden, sonst Fruchtfall	kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge	auf günstigem Standort ab Ende August, sonst Mitte September	ab Ende September	3 - 4 Wochen haltbar, am besten im kühlen Freilager
Novembra	grün, gelb aufgehellte, fleischig, saftig süß	mittelstark, Halbstamm	sehr robuste Sorte	robust gegen Pilzkrankheiten	Anfang Oktober	ab Oktober	bis Ende Dezember
Zwetschgen							
Wangenheims Frühzwetschge	mittelgroß, dunkel violett, sehr süß und saftig	stark, breit ausladende Krone, selbstfruchtbar	frosthart, auch für rauere Lagen geeignet	kaum anfällig, robust	Ende August bis Anfang September	Ende August	3 Wochen haltbar
Hanita	mittelgroß, gut steinlösend, guter Geschmack	mittel bis stark wachsend, selbstfruchtbar	auch für höhere Lagen geeignet	kaum anfällig	Anfang September	Anfang September	3 Wochen haltbar
Elena	mittelgroß, dunkelblau, gut steinlösend, süß	mittelstark, Halbstamm	Frischverzehr und Kuchenbelag	wenig krankheitsanfällig, scharkatolerant	Anfang Oktober	Oktober	bei 1 °C bis zu 6 Wochen
Quitten							
Cydora Robusta	leuchtend gelb, süß-saures Aroma	mittelstark	hohe und frühe Fruchtbarkeit, für alle Verarbeitungsarten geeignet	tolerant gegenüber Feuerbrand, mehltauresistent, blattfleckenresistent, sehr robust	Anfang bis Mitte Oktober	Oktober bis November	bis Dezember bei 0 - 2 °C, nicht in der Nähe von anderen Obstsorten lagern
Quercus robur, Stiel-Eiche	längliche, ovale Frucht, mit Fruchtbecher	20 - 25 m Höhe, kegelförmige Krone	bodentolerant, frosthart, windfest	kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge			
Acer campestre, Feld-Ahorn	braune Flügel Frucht	6 - 12 m Höhe, rundliche bis kegelförmige Krone	anspruchlos, verträgt Trockenheit und Hitze	wenig anfällig für Krankheiten, manchmal Gallmilben			

zusammengestellt April 2011, Sortiment der Streuobstaktion, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau

Hinweis zu der Bakterienkrankheit Feuerbrand in Streuobstanlagen:

Es wurden bewußt Sorten herausgesucht, die weniger anfällig für Feuerbrand sind. Eine Erkrankung des Baumes ist jedoch nie ganz auszuschließen. Trotz der zunehmenden Ausbreitung muss das Ziel sein, den Streuobstanbau zu erhalten und auszubauen. Der landschaftliche Nutzen ist sehr viel größer als die Verbreitung der Krankheit. Ist ein Obstgehölz mit Feuerbrand infiziert, so müssen kranke Pflanzenteile umgehend und sorgfältig entfernt werden. Das anfallende Schnittgut wird nach Möglichkeit vor Ort verbrannt. Kleinere Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden. Feuerbrand ist meldepflichtig.

Sortenbeschreibungen zur Streuobstaktion 2013

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Äpfel							
Fromms Goldrenette	Grünlich gelb, Fruchtfleisch fein, saftig, würzig	Starker Wuchs, breit ausladend	Tafel- und Wirtschaftsapfel	robust	Mitte Oktober	ab Ende November	bis März
Brettacher	großfrüchtig, saftig herb gewürzt mit erfrischender Säure	stark, breite Krone, mittelfrüher Ertrag	Zufallssämling nicht für nasse Böden geeignet Tafel- und Wirtschaftsapfel	wenig anfällig	Mitte Oktober	ab Februar	bis Mai
Roter Boskoop Halbstamm	groß, rotschalig, saftig angenehm säuerlich	stark, später Ertrag, kein Pollenspender	Wirtschaftsapfel		Mitte Oktober	Mitte Dezember	April
Jakob Fischer	groß, unregelmäßige Form, flächig rot, weißes Fruchtfleisch	sehr starker, gesunder Wuchs, breite, lockere Krone	gelegentliche Auslichtung notwendig wegen des starken Wuchses, sehr guter Tafelapfel	Widerstand gegen Feuerbrand, auf schweren und kalten Böden krebsanfällig	ab Mitte August	ab September	bis November, dann mehlig werdend
Borowinka	Große Früchte, saftig aromatisch, verwaschen rote Schale	Starkes Wuchs	Aus Russland und seit 100 Jahren in Bayern verbreitet	robust	Ende Oktober	ab November	bis Ende Dezember
Danzinger Kantapfel	mittelgroß, saftig, leicht gewürzt, rotschalig	anfangs kräftig, später mittelstarke Verzweigung -> Auslichtung	vollkommene Frosthärte	wenig anfällig	Ende September	Oktober	bis Ende November
Schöner aus Herrnhut	mittel, rot geflammt, saftig würzig	mittelstark, Krone hochkugelig, frosthartes Holz	seit 1900, sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel	robust, sehr frosthart, ziemlich widerstandsfähig	ab Ende September	ab Oktober	bis Februar
Kaiser Wilhelm	groß, knackig und saftig, grüngelb bis rot	sehr wüchsig	Tafel- und Mostapfel, hohe Erträge	widerstandsfähig	Anfang Oktober	ab Dezember	bis März
Roter Trierer Weinapfel	bei später Ernte süßer, zimtartig gewürzt, Schale intensiv rot	Starker Baumwuchs	Tafel- und Wirtschaftsapfel, gute Mostsorte	robust	Ende Oktober	Ab Mitte November	bis März
Gravensteiner Halbstamm	mittelgroß, gelb bis rötlich geflammt, saftiges gelblich weißes Fruchtfleisch	sehr kräftiger Wuchs, mäßiger Aufbauschnitt notwendig	Früchte reifen nicht gleichzeitig, Sorte für den Garten	etwas schorf- und mehltauanfällig	ab Anfang September	ab Anfang Oktober	bis Ende Dezember
Schöner aus Wiltshire	mittelgroß, grünlichgelb, duftend, süßaromatisch	erst starker Wuchs, später mittelstark, guter Pollenspender, kann sehr alt werden	auch für raue Höhenlagen und regenreiche Gebiete geeignet	kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge	ab Mitte September	ab November	bis Dezember
Schöner von Nordhausen	mittelgroß, fettig-grün, später goldgelb	kräftig	Tafel- und Wirtschaftsapfel	widerstandsfähig gegen Frost	Mitte Oktober	Januar bis April	bis April, gute Lagerfähigkeit
Bohnapfel	klein bis mittelgroß, grün bis gelbgrün, saftig säuerlich	mittelstark, ausreichende Verzweigung, im Holz frosthart	für Streuobstflächen, lange haltbare - für Verwertung	gering Feuerbrand u. Schorf, ohne Mehltau u. Stippe, robust	Ernte erst nach einigen Jahren, ab Mitte Oktober	ab Februar, Früchte hängen windfest am Baum	gut lagerfähig, bis Mai
Alkmene Halbstamm	Mittelgroß, grünlichgelb, rote Deckfarbe aromatisch saftig	Kompakter Wuchs	Tafel- und Wirtschaftsapfel	Robust, auf Feuerbrand achten	Mitte September	ab Mitte September	Maximal bis Ende November

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
<u>Birnen</u>							
Doppelte Philippsbirne	groß, saftreich	stark	seit 1800	robust	September	Ende September	bis Oktober
Pastorenbirne	langgestreckt, graugrün, saftig, windfest	Schnitt nötig, eher wärmere Böden	ca. 1760 in Frankreich, Tafelbirne und gute Wirtschaftsf Frucht	etwas schorfanfällig und Spitzendürre	Ende September	Ende Oktober	bis Januar
Sommerblutbirne Halbstamm	Kleine kugelförmige Frucht, Fruchtfleisch rötlich	Mittelgroße Bäume, hängende Äste	sehr alte Sorte, Dörrbirne, Frischverzehr und Kompott		Mitte August bis Anfang September	sofort	keine
<u>Zwetschgen</u>							
<u>Mirabelle</u>							
Wangenheims Frühzwetschge	mittelgroß, dunkel violett, sehr süß und saftig	stark, breit ausladende Krone, selbstfruchtbar	frosthart, auch für rauere Lagen geeignet	kaum anfällig, robust	Ende August bis Anfang September	Ende August	3 Wochen haltbar
Hauszwetschge	mittelgroß, süß, saftig, gut steinlösend	stark, aufrecht, Verjüngungsschnitt vorteilhaft	seit Jahrhunderten, verschiedene Typen	wenig krankheitsanfällig	Ende September		
Mirabelle von Nancy	klein, fest, hellgelb, bei Regen platzempfindlich	stark, später breitkronig	wertvollste Mirabellensorte, hoher Ertrag		Mitte bis Ende August		
Juglans regia Walnuss Sämling	Walnüsse, Qualität bei Sämlingen unterschiedlich	Großer Baum, runde Krone 12 - 16 m Höhe	In der Jugend frostempfindlich	bei schlechtem Stand anfälliger	September	Ab November nach der Trocknung	bis Februar
Acer pseudoplatanus Bergahorn	Flügel Frucht	20 - 25 m Höhe, breit ausladend	Für kalkhaltige Böden geeignet, frisch feucht	Strahlungshitze meiden			
Quercus robur Stieleiche	längliche, ovale Frucht, mit Fruchtbecher	20 - 25 m Höhe, kegelförmige Krone	bodentolerant, frosthart, windfest	kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge			

zusammengestellt Mai 2013, Sortiment der Streuobstaktion, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau

Sortenbeschreibungen zur Streuobstaktion 2015





Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genussreife	Lagerung
Äpfel							
Wettringer Taubenapfel	klein bis mittelgroß, zur Reife: intensiv rot gefärbt	stark wachsend, Krone hochpyramidal	robust, anspruchslos und pflegeleicht, sehr frosthart	widerstandsfähig gegenüber Krankheiten und Schädlingen	Ende September / Oktober	ab Oktober	bis Januar
Riesenboikenapfel 20 Stück verfügbar	(sehr) groß, süß - säuerlicher Geschmack, Fruchtfleisch reinweiß, fein und fest	wächst mäßig, bildet eine sehr hohe, flach gewölbte Krone	regelmäßiger Ertrag, anspruchslos bei Boden & Klima	sehr robust, gering anfällig für Schorf und Mehltau	September	ab Oktober	bis März
Jakob Fischer	groß, unregelmäßige Form, flächig rot, weißes Fruchtfleisch	sehr starker, gesunder Wuchs, breite, lockere Krone	gelegentliche Auslichtung notwendig, sehr guter Tafelapfel	auf schweren und kalten Böden krebsanfällig	ab Mitte August	ab September	bis November
Borowinka 40 Stück verfügbar	große Früchte, saftig aromatisch, verwaschen rote Schale	starker Wuchs	aus Russland und seit 100 Jahren in Bayern verbreitet	robust	Ende Oktober	ab November	bis Ende Dezember
Winterrambur	groß, saftig, leicht säuerlich, hoher Vitamin-C Gehalt	aufrecht, stark verzweigt, große und kräftige Krone	Baum kann (sehr) alt werden, geringer Schnittaufwand	widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge	Mitte - Ende Oktober	Dezember bis März	teilweise sogar bis April
Schöner aus Herrnhut	mittel, rot geflammt, saftig würzig	mittelstark, Krone hochkugelig	seit 1900, sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel	robust, sehr frosthart, ziemlich widerstandsfähig	ab Ende September	ab Oktober	bis Februar
Kaiser Wilhelm	groß, knackig und saftig, grüngelb bis rot	sehr wüchsig	Tafel- und Mostapfel, hohe Erträge	widerstandsfähig	Anfang Oktober	ab Dezember	bis März
Roter Trierer Weinapfel	bei später Ernte süße, zimtartig gewürzte Frucht, Schale intensiv rot	starker Baumwuchs	Tafel- und Wirtschaftsapfel, gute Mostsorte	robust	Ende Oktober	ab Mitte November	bis März
Schöner aus Wiltshire	mittelgroß, grünlichgelb, duftend, süßaromatisch	erst starker Wuchs, später mittelstark, guter Pollenspender, kann sehr alt werden	auch für raue Höhenlagen und regenreiche Gebiete geeignet	kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge	ab Mitte September	ab November	bis Dezember
Schöner von Nordhausen	mittelgroß, fettig-grün, später goldgelb	kräftig	Tafel- und Wirtschaftsapfel	widerstandsfähig gegen Frost	Mitte Oktober	ab Januar	bis April gute Lagerfähigkeit
Steeds Unerreicht 50 Stück verfügbar	Groß, gelb-grün mit rotem Anteil, säuerlich	sehr ertragreich	für Streuobstflächen, lange haltbar - für Verwertung	robust	Mitte Oktober	ab Dezember	bis März
Rajka Halbstamm	mittelgroß, gelb bis rote Schale, saftig, leicht gewürzt, aromatisch	mittel bis stark, breit, dicktriebzig, dicht verzweigt	Tafelapfel, regelmäßiger Ertrag	schorffresistent, gering anfällig für Mehltau	Mitte - Ende September	ab Oktober	bis Dezember
Roter Boskoop Halbstamm	groß, rotschalig, saftig angenehm säuerlich	stark, später Ertrag, kein Pollenspender	Wirtschaftsapfel	gering für Feuerbrand und Mehltau anfällig	Mitte Oktober	ab November	bis April
Santana Halbstamm	groß, saftig, süß mit ausgeprägter Säure, aromatisch	stark wachsend, breit aufrecht, stark verzweigt	Gute Erfahrungen bei Allergikern	luftiger Standort da bedingt anfällig für Schorf	Mitte - Ende September	ab Oktober	bis Januar

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genussreife	Lagerung
<u>Birnen</u>							
Doppelte Philippsbirne	mittelgroß – groß, saftreich, süß, schwach säuerlich, meist gut gewürzt	stark, meist breite und pyramidale Krone	seit 1800	robust	September	Ende September	bis Oktober
Bayerische Weinbirne	sehr groß, flaschenförmig, sehr saftig	stark wachsend, Krone rundlich bis breit oval	beliebte Mostbirne, kann (ur-)alt werden	wenig Krankheiten, feuerbrandbeständig	Mitte Oktober	ab Oktober	bis November (meist nur einige Wochen)
Gute Graue Halbstamm	klein bis mittelgroß, kreiselförmig, angenehm süß, mit feiner Säure, gut würzig	wächst sehr stark, bildet eine große Krone	Bäume können hohes Alter erreichen	ziemlich widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge	Ende August - Anfang September	Mitte September	ca. 2 Wochen
<u>Zwetschgen</u>							
<u>Mirabelle</u>							
Schönberger	mittelgroß, dunkelblau, saftig, wohlschmeckend, aromatisch, süß, Stein gut lösbar	breit ausladender Wuchs	seit 1909, anspruchslos an Boden und Klima, Tafel und Wirtschaftsf Frucht	robuste Eigenschaften gegenüber Krankheiten	Ende August - Anfang September	September	ca. 2-3 Wochen
Hauszwetschge	mittelgroß, süß, saftig, gut steinlösend, würzig	stark, aufrecht, Verjüngungsschnitt vorteilhaft	seit Jahrhunderten, verschiedene Typen, Tafel und Wirtschaftsf Frucht	wenig krankheitsanfällig	Ende September	September / Oktober	kurzzeitig möglich
Nancy Mirabelle Halbstamm	(sehr) süß, fast kugelförmig, aromatisch, saftig	(mittel)stark wüchsig, später breitkronig	guter Pollenspender, hohe und regelmäßige Erträge, froshart	Scharka tolerant	Mitte - Ende August	Mitte - Ende August	
Verschiedene							
Pfirsich Revita Halbstamm	groß, sehr saftig, feinsäuerlich-süß,	Wuchs nicht ausufernd aber kräftig	hoher Zierwert (schöne dunkelrosa Blüten), geschützter Standort	geringe Anfälligkeit gegen Kräuselkrankheit	Mitte - Ende August	August	Frischverzehr
Mispel -Busch	kleine, braune, etwas apfelähnliche Früchte	typisch knorriger Wuchs, ca. 3-5 m hoch, meist genauso breit	hoher Zierwert aufgrund ca. 4 cm cremeweißer Blüten	wird nur selten von Krankheiten befallen oder von Insekten geschädigt	im Spätherbst	nach erstem Frost	
Eßbare Eberesche Heister	hoher Vitamin-C Gehalt	meist schlanke pyramidale Krone	können 50-60 Jahre alt werden	Geringe Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge	September		
Stieleiche Quercus robur Heister 125cm, autochthon	längliche, ovale Frucht, mit Fruchtbecher	20 - 25m Höhe, kegelförmige Krone	bodentolerant, froshart, windfest	kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge	<u>Qualität:</u> Heister, 1x verpflanzt, ohne Ballen	<u>Herkunft:</u> gebietsheimisch 09	

Sortiment der Streuobstaktion 2015, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau

Sortenbeschreibungen zur Streuobstaktion 2017

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genussreife	Lagerung
Äpfel							
Wettringer Taubenapfel	klein bis mittelgroß, zur Reife: intensiv rot gefärbt	stark wachsend, Krone hochpyramidal	robust, anspruchslos und pflegeleicht, sehr frosthart	widerstandsfähig gegenüber Krankheiten und Schädlingen	Ende September / Oktober	ab Oktober	bis Januar
Gravensteiner	mittelgroß, gelb bis rötlich geflammt, saftiges gelblich weißes Fruchtfleisch	sehr kräftiger Wuchs, mäßiger Aufbauschnitt notwendig	Früchte reifen nicht gleichzeitig, Sorte für den Garten	etwas schorf- und mehltauanfällig	ab Anfang September	ab Anfang Oktober	bis Ende Dezember
Jakob Fischer (Bio) 	groß, unregelmäßige Form, flächig rot, weißes Fruchtfleisch	sehr starker, gesunder Wuchs, breite, lockere Krone	gelegentliche Auslichtung notwendig, sehr guter Tafelapfel	auf schweren und kalten Böden krebsanfällig	ab Mitte August	ab September	bis November
Borowinka	große Früchte, saftig aromatisch, verwaschen rote Schale	starker Wuchs	aus Russland und seit 100 Jahren in Bayern verbreitet	robust	Ende Oktober	ab November	bis Ende Dezember
Winterrambur	groß, saftig, leicht säuerlich, hoher Vitamin-C Gehalt	aufrecht, stark verzweigt, große und kräftige Krone	Baum kann (sehr) alt werden, geringer Schnittaufwand	widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge	Mitte - Ende Oktober	Dezember bis März	teilweise sogar bis April
Dülmener Rosenapfel	groß, gelb mit roter Deckfarbe fein gewürzt	mittelgroß	1870 Sämling von Gravensteiner, Alternanz	robust	Ende September	September	Bis November
Kaiser Wilhelm	groß, knackig und saftig, grüngelb bis rot	sehr wüchsig	Tafel- und Mostapfel, hohe Erträge	widerstandsfähig	Anfang Oktober	ab Dezember	bis März
Roter Trierer Weinapfel (Bio) 	bei später Ernte süße, zimtartig gewürzte Frucht, Schale intensiv rot	starker Baumwuchs	Tafel- und Wirtschaftsapfel, gute Mostsorte	robust	Ende Oktober	ab Mitte November	bis März
Schöner aus Wiltshire	mittelgroß, grünlichgelb, duftend, süßaromatisch	erst starker Wuchs, später mittelstark, guter Pollenspender, kann sehr alt werden	auch für raue Höhenlagen und regenreiche Gebiete geeignet	kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge	ab Mitte September	ab November	bis Dezember
Schöner von Nordhausen	mittelgroß, fettig-grün, später goldgelb	kräftig	Tafel- und Wirtschaftsapfel	widerstandsfähig gegen Frost	Mitte Oktober	ab Januar	bis April gute Lagerfähigkeit
Fromms Renette (Galloway Pepping)	Grünlich gelb, Fruchtfleisch fein, saftig, würzig	Starker Wuchs, breit ausladend	Tafel- und Wirtschaftsapfel	robust	Mitte Oktober	ab Ende November	bis März
Berleis max. 50 Stück Synonym Roter Weilheimer	Deckfarbe ist rot; Fleisch cremefarben, fest, feinzellig, aromatisch	Kräftig, breitwüchsig Neue Sorte aus Weilheim, Sortenschutz seit 2008	Tafel- und Wirtschaftsapfel	widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge, späte Blüte	Mitte Oktober	ab Dezember	bis Juni
Roter Mond Halbstamm 20 verfügbar	Rote Frucht mit rotem Fruchtfleisch, säuerlich, pinkfarbene Blüten	mittelstark	Wirtschaftsapfel	robust	Mitte September	ab Mitte September	bis Dezember
Rayka Halbstamm Bio 	mittelgroß, gelb bis rote Schale, saftig, leicht gewürzt, aromatisch	mittel bis stark, breit, dicktriebzig, dicht verzweigt	Tafelapfel, regelmäßiger Ertrag	schorffresistent, gering anfällig für Mehltau	Mitte - Ende September	ab Oktober	bis Dezember

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genussreife	Lagerung
<u>Birnen</u>							
Novembra (Bio) 	grün, gelb aufgehellt, festfleischig, saftig süß	mittelstark	sehr robuste Sorte	robust gegen Pilzkrankheiten	Anfang Oktober	ab Oktober	bis Ende Dezember
Bayerische Weinbirne	sehr groß, flaschenförmig, sehr saftig	stark wachsend, Krone rundlich bis breit oval	beliebte Mostbirne, kann (ur-)alt werden	wenig Krankheiten, feuerbrandbeständig	Mitte Oktober	ab Oktober	bis November (meist nur einige Wochen)
Rote Williams Halbstamm Spalier für große Gebäude	Groß, sehr schmackhaft	mittelstark, sparrig	Tafel- und Wirtschaftsbirne, Befruchters. notw.	Empfindlich, deshalb Spalier	Anfang September	Anfang September	ca. 2 Wochen
Vier vergessene Birnenraritäten auf Anfrage für dauerhaft gesicherte Obststandorte	<i>Haferbirne – alle aus dem Lkr. Miesbach</i>	<i>Blutbirne, mittelgr. Frucht, Reife Sept., keine Sommerblutbirne</i>	<i>Semmelbirne, keine Alternanz, robust, Dörrbirne, auch frisch schmackhaft</i>	<i>Muskatellerbirne, kleine schmackhafte Sommerbirne robust hoher Ertrag</i>			
<u>Zwetschge</u>							
Feilenbacher Zwetschge	mittelgroß, dunkelblau, saftig, wohlschmeckend, aromatisch, süß, Stein gut lösbar	breit ausladender Wuchs	seit 1909, anspruchslos an Boden und Klima, Tafel und Wirtschaftsfrucht	robuste Eigenschaften gegenüber Krankheiten	Ende August - Anfang September	September	ca. 2-3 Wochen
Hauszwetschge (Bio) Halbstamm 	mittelgroß, süß, saftig, gut steinlösend	stark, aufrecht, Verjüngungsschnitt vorteilhaft	seit Jahrhunderten, verschiedene Typen	wenig krankheitsanfällig	Ende September		
<u>Quitte Halbstamm</u>							
Cyodora Robusta	Apfelquitte mit hohem Ertrag und früher Reife		Wenig Fleischbräune	Sehr geringe Feuerbrandgefährdung	früh		
Isopolinskaja (Bio) 	Hoher Ertrag		Wenig Fleischbräune	Sehr geringe Feuerbrandgefährdung	spät		
Birnenquitte (Bio) Limon Ayvasi 	Hoher Ertrag		Wenig Fleischbräune	geringe Feuerbrandgefährdung	mittel		
<u>Verschiedene</u>							
Sommerlinde Tilia platyphyllus Heister 125cm, autochthon	Blüte wichtige Bienentracht	35 m Höhe, breit ausladend	anspruchsvoll, frische tiefgründig Böden bevorzugt Schluchtwälder	kaum anfällig, wärmeliebend	Qualität: Heister, 1x verpflanzt, ohne Ballen	Herkunft: gebietsheimisch 09	Einzelstand geeignet, Dorflinde, Hausbaum, Landschaft
Stieleiche Quercus robur Heister 125cm, autochthon	längliche, ovale Frucht, mit Fruchtbecher	20 – 25 m Höhe, kegelförmige Krone	bodentolerant, frosthart, windfest	kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge	Qualität: Heister, 1x verpflanzt, ohne Ballen	Herkunft: gebietsheimisch 09	

Sortiment der Streuobstaktion 2017, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau, H.Grosser@lra-wm.bayern.de

Sortenbeschreibungen zur Streuobstaktion 2019

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genussreife	Lagerung
Äpfel							
Roter Boskoop	groß, rötlich, saftig angenehm säuerlich	stark, später Ertrag, kein Pollenspender	Wirtschaftsapfel	gering für Feuerbrand und Mehltau anfällig	Mitte Oktober	ab November	bis April
Marschanker (?Steirischer) Verfügbar ca 35 St.	Mittelgroß, gelb	Große breite Krone	Tafelapfel, braucht guten Boden	Schorf in Tallagen	Ende Oktober	Ende Dezember	Bis Mai
Biesterfelder Renette Verfügbar ca 25 St.	Groß, mild aromatisch, lange Blütezeit	Ausladende Krone	Tafel- und Wirt- schaftsapfel	Evtl. Stippe	Anf. September	Ab September	bis November
Brettacher	großfrüchtig, saftig herb gewürzt mit erfrischen- der Säure	stark, breite Krone, mittel- früher Ertrag	Zufallssämling nicht für nasse Böden geeignet Tafel- und Wirtschaftsapfel	wenig anfällig	Mitte Oktober	ab Februar	bis Mai
Goldrenette von Blenheim	Groß, saftig gewürzt	breit gewölbte Krone,	Tafel- und Wirt- schaftsapfel, spät einsetzender Ertrag	Wenig anfällig auf nährstoffreichen Lehmböden	Anfang Oktober	Ab November	bis März
Schöner aus Wiltshire	mittelgroß, grünlichgelb, duftend, süßaromatisch	erst starker Wuchs, später mittelstark, guter Pollenspender, kann sehr alt werden	auch für raue Höhenlagen und regenreiche Gebie- te geeignet	kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge	ab Mitte September	ab November	bis Dezember
Ontario	frischsauerlich, groß	Mittel	Tafel- und Wirt- schaftsapfel	Wenig anfällig	Ende Oktober	ab Dezember	bis Mai
Roter Herbstkalvill	Groß, kantig, dunkelrote Deckfarbe, Fruchtfleisch rötlich marmoriert	Breite große Krone	Frischverzehr, Dörrobst	In der Höhe wenig anfällig	Ab Mitte September	September	Bis November
Grahams Jubiläumsapfel	gelbgrün, nur leicht gerötet, weniger süß	mittelstark, im Holz frosthart u. gesund	„Bäckerapfel“, Stücke bleiben fest	widerstandsfähig ge- gen Frost u. Schorf	ab Mitte September	ab Ende September	bis Ende Oktober
Melrose	Saftig süß, feste Schale	mittelstark	Eher wärmeliebend	Bisher gute Erfahrun- gen entgegen der Beschreibungen	Ab Mitte Oktober	Ab November	Bis März
Batullenapfel	Mittelgroß, späte Blüte	mittelstark	Gut zum Dörren Wirtschaftsapfel, Alternanz	Wenig anfällig	Ab Mitte Oktober	Ab November	Bis April im Naturla- ger
Haux	Groß, festes Frucht- fleisch	groß, breit	gute Mostsorte	Wenig anfällig	Mitte September	Ab Oktober	Bis Februar
Rayka Halbstamm	mittelgroß, gelb bis rote Schale, saftig, leicht gewürzt, aromatisch	mittel bis stark, breit, dicht verzweigt	Tafelapfel, regel- mäßiger Ertrag	schorffresistent, gering anfällig für Mehltau	Ende September	ab Oktober	bis Dezember
Rubinola Halb- stamm	gelb, orange gestreift aromatisch	mittelstark	Neuzüchtung, Tafel- und Wirt- schaftsapfel	widerstandsfähig	Oktober	Oktober	bis März

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderes	Krankheiten	Pflückreife	Genussreife	Lagerung
<u>Birnen</u>							
Vereinsdechant-birne	Mittelgroß, saftig schmelzend auf guten Standorten	Für Spalier geeignet	Späte Blüte, guter Pollenspender	Kann Feuerbrand bekommen	Ende September	Ende September	Bis Anf. November
Pastorenbirne	langgestreckt, graugrün, saftig, windfest	Schnitt nötig, eher wärmere Böden	ca. 1760 in Frankreich, Tafelbirne Wirtschaftsfrucht	etwas schorfanfällig und Spitzendürre	Ende September	Ende Oktober	bis Januar
Alexander Lukas Halbstamm als Spalier für große Wände	Groß, reif gelbe Schale	Hohe Krone mit überhängenden Fruchtästen	Windgeschützte Lage, für rauhe Lagen geeignet	Wenig anfällig	Ende September	Mitte November	Anf. Dezember
<u>Walnüsse</u>							
Mars	Späte Blüte, schmackhafte Nüsse	Groß , mind. 100m ²	Winterhart, Ertrag nach 4 -5 Jahren selbstfruchtbar	Widerstandsfähig gegen Blattkrankheiten	Mitte September		
Seifersdorfer	Frühe Blüte , schmackhafte Früchte	Mittel, 60 – 80m ²	Winterhart, Ertrag nach 4 -5 Jahren selbstfruchtbar	Widerstandsfähig gegen Blattkrankheiten	September		
<u>Steinobst</u>							
Bühler Frühzwetschge	Mittelgroß, feste Frucht, süß, gut steinlösend, saftig	Kräftig , steiler Wuchs	Regelmäßiger Ertrag, aber erst spät einsetzend	widerstandsfähig	Mitte August	-	-
Reneclode Graf Althans	Groß, rund grünlich bis violett, Fruchtfleisch gelb, fest, saftreich	Mittelstark, sparrig	Frischverzehr, anspruchslos	Wenig anfällig	Ende August	-	-
Bellamira (Mirabelle) Halbstamm	rund, goldgelb, fest, saftig, steinlösend	mittelstark	sehr früh einsetzender und hoher Ertrag	scharkatolerant, platzfest	Mitte August	August	bei 1°C bis zu 6 Wochen
Aprikose Halb-stamm als Spalier Ungarische Beste	Mittelgroß, schwach wollig, sattgelb bis rot, Stein gut lösend	Mittel, frosthart	Möglichst mildes Klima	Wenig anfällig	Mitte August	-	-
Sauerkirsche Halb-stamm als Spalier Achat 20 St.	süße Sauerkirsche	Stark wachsend, wenig verkahlend	Neue Sorte, Selbstversorgeranbau geeignet	Wenig Monilia, bei Feuchtigkeit Sprühfleckenkrankheit	Mitte Juli		
<u>Verschiedene</u>							
Winterlinde Tilia cordata Heister 125cm, autochthon	Blüte wichtige Bienentracht	35 m Höhe, breit ausladend	anspruchsvoll, frische tiefgründig Böden bevorzugt Schluchtwälder	kaum anfällig, wärme-liebend	<u>Qualität:</u> Heister, 1x verpflanzt, ohne Ballen	<u>Herkunft:</u> gebietsheimisch 09	Einzelstand geeignet, Dorflinde, Hausbaum, Landschaft
Stieleiche Quercus robur Heister 125cm, autochthon	längliche, ovale Frucht, mit Fruchtbecher	20 – 25 m Höhe, kegelförmige Krone	bodentolerant, frosthart, windfest	kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge	<u>Qualität:</u> Heister, 1x verpflanzt, ohne Ballen	<u>Herkunft:</u> gebietsheimisch 09	

Sortiment der Streuobstaktion 2019, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege WM-SOG, H.Grosser@lra-wm.bayern.de

Sorten und Beschreibungen

Streuobstaktion 2021

Stand: 26.04.2021, Johann-Christian Hannemann, Kreisfachberatung für Gartenkultur, LRA Weilheim-Schongau

Sorte	Frucht	Geschmack	Verwendung	Pflückreife	Genußreife / Lagerdauer	Baumwuchs / Wuchsstärke	Verträglichkeit Apfelallergiker*	Anfälligkeit & Resistenzen	Blütezeit	Kronenform / spezielle Pflegemaßnahmen
Apfelsorten (nach Reifezeit und Haltbarkeit sortiert)										
Pfirsichroter Sommerapfel (Frühapfel)	robuste, sehr attraktive Sommersorte für den Frischverzehr, etwas fettige Schale	für einen Frühapfel sehr gut: mild-säuerlich, rosenartig gewürzt, sehr saftig	Tafelobst	früh, Mitte August (Früchte reifen nicht gleichzeitig)	ca. 2 Wochen	anfangs stark, später mittelstark	keine Angabe (k.A.)	gute Winterfrosthärte, breit anbaufähig bis in Höhenlagen um 1000 m; gering anfällig für Schorf, Krebs, Mehltau und Schädlinge	früh	breitrund, hängend
Biesterfelder Renette	sehr aromatische, zur Reife rote, unregelmäßig berostete Frühsorte	würziges Muskatellerwein-Aroma; süß mit zurückhaltender Säure	Tafelobst	Ende August - Anfang September	September bis November	stark	verträglich	gesund, auch für Höhenlage, in schweren/ nassen Böden ggf. Krebs; starker Schnitt & starke Düngung fördern Stippe	k.A.; als Pollenspender ungeeignet	breit ausladend, nicht für Straßen und Wege; Leitäste schräg aufstrebend; kaum Erhaltungsschnitt nötig; Blüten/Früchte auslichten, um Alternanz vorzubeugen
Alkmene	schöner Tafelapfel; die einzige, wirklich robuste Cox-Orange-Kreuzung	Aroma nach Orangenblüten, Rosen- und Muskat (erinnert an Cox Orange), eher süß mit wenig Säure	Tafelobst (Vermarktungs-Eignung)	Mitte September	September bis November (ggf. sogar bis März)	mittelstark, später nachlassend (Hausgarteneignung)	verträglich	Robust gegen Schorf, Mehltau und Obstbaumkrebs; ggf. anfällig für Blattläuse und Trieb-Monilia	früh; guter Pollenspender	aufrecht, relativ klein mit waagerechter Stellung der Seitenäste; Verjüngungsschnitte und regelmäßige Auslichtung sind für gleichbleibende Fruchtqualität wichtig
Himbeerapfel von Holowaus/ Holovous	mittelgroße bis große, flachrunde Früchte mit sonneitig leuchtender Rotfärbung; glatte Schale; weißes Fruchtfleisch mit rötlichem Hauch	süß, himbeer-/rosen-aromatisch, mit wenig Säure (vgl. Idared)	Tafelobst, Backobst	Anfang Oktober	Oktober bis Dezember (ggf. bis Februar)	mittelstark bis stark	k.A.	relativ robust gegenüber Krankheiten, sehr genügsame Sorte, auf nährstoffreichen Böden auch in Höhenlagen	mittelfrüh bis spät	rund, gut verzweigt
Martens Sämling (Juwel aus Kirchwerder)	großfrüchtige, von der Sonne rot gestreifte bis rot-verwaschene Frühherbst-Sorte mit schönen weißen Schalenpunkten	süßsauerlich, fein aromatisch, saftig-knackig	Tafelobst (Vermarktungs-Eignung), Kompott, Marmelade	Mitte bis Ende September	September bis November	sehr stark	k.A.	robust, vermutlich auch noch für Höhenlagen; örtlich etwas Schorf, liebt Lehmböden	früh; als Pollenspender ungeeignet	hohe, breit-ausladende Krone mit lockerer Verzweigung
Rote Sternrenette	sehr ansprechender Tafelapfel mit sternförmigen Schalenpunkten und z.T. rötlich gefärbtem Fruchtfleisch	sehr guter Geschmack, rosenartig parfümiertes Aroma; Geschmack säuerlich-süß, weinig, gewürzt	Tafelobst	Anfang Oktober	Oktober bis Dezember	stark	verträglich	sehr robust, auch für höhere Lagen	spät; guter Pollenspender	zunehmend starker, aufrechter Wuchs
Adamsapfel	große und rundliche Früchte mit karminroter, glatt-glänzender Schale	ausgezeichnet himbeerig, feinwürziger, bittermandelartiger Geschmack mit ausgewogenem Zucker-Säureverhältnis; saftig	Tafelapfel, Mostobst, Wirtschaftsobst	Oktober	Dezember bis März		verträglich	gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Frost und Krankheiten	k.A.	dicke, kurze Triebe
Borowinka	große Früchte mit verwaschen geröteter, dunkel gestreifter Schale	sehr saftig, aromatisch-süß mit wenig Säure, schmelzend	Tafelobst	Ende Oktober	November bis Januar	stark	k.A.	schorffresistent, Feuerbrand-tolerant, sehr frosthart	k.A.	k.A.
Finkenwerder Prinzenapfel	glockenförmiger, gelber, halbseitig rot-gestreifter Winterapfel	wohlschmeckend, erfrischend süß-säuerlich, aromatisch (das leichte Cox-Aroma kommt erst nach der Lagerung zur Geltung!)	Tafelobst (Vermarktungs-Eignung)	Mitte Oktober	November bis März	mittelstark (für Hausgarten und Streuobstwiese)	verträglich	sehr robust gegen Schorf, Mehltau und Obstbaumkrebs, auch noch für Höhenlagen	k.A.; guter Pollenspender	in die Breite gehend/hängend; nicht für Straßen/Wege
Holsteiner Cox	gelb-rötlicher, runder, mittelgroßer Apfel	süß, Cox-ähnlich edel-aromatisch, saftig	Tafelobst (Vermarktungs-Eignung), Backen, Kochen	Mitte Oktober	Oktober bis Januar	stark	verträglich	auf schweren Böden ggf. etwas Krebs (staunasse Böden meiden oder aufbessern)	k.A.; als Pollenspender ungeeignet	breit ausladend, nicht für Straßen und Wege

Sorte	Frucht	Geschmack	Verwendung	Pflückreife	Genußreife / Lagerdauer	Baumwuchs / Wuchsstärke	Verträglichkeit Apfelallergiker*	Anfälligkeit & Resistenzen	Blütezeit	Kronenform / spezielle Pflegemaßnahmen
Roter Bellefleur	glatte, stark glänzende, gelblich-grüne bis zitronengelbe Früchte mit sonnenseitiger Rötung	feines leicht weiniges Aroma mit hohem Zuckergehalt und genügend Säure; knackig, saftig	Wirtschaftsapfel, Tafelapfel	Mitte/Ende Oktober	Dezember bis April	stark	k.A.	sehr robust; für Höhenlagen: trägt auch in Jahren, in denen andere Sorten wegen Blütenfrost ausfallen; Früchte sturmfest; auf nassen Böden ggf. etwas Krebs	extem spät; evtl. teilweise selbstfruchtbar	breitkugelförmig, stark hängend nicht für Straßen und Wege
Korbinianapfel (Stina Lohmann)	grüngelb bis sattgelb, sonnenseits rot geflammte Früchte mit hellen Schalenpunkten	süßsäuerlicher Winterlagerapfel mit festem Fruchtfleisch	Tafelobst, Backen, Trocknen, Kochen, Saft, Wein, Brennerei	Ende Oktober bis Mitte November	Dezember bis Mai	stark	k.A.	geringe Ansprüche, bis in mittlere Höhenlagen; Schorf-widerstandsfähig; allgemein sehr gering anfällig; nicht für Staunässe geeignet	spät	breite ausladende Krone, kräftiger Wuchs
Weißer Winterlockenapfel	sehr gute und robuste, glockenförmige Winter-Vermarktungssorte mit guter Lagerfähigkeit	säurebetont, etwas zitronenartig, Süße und angenehmes Aroma erst nach Aufhellung der grünen Fruchtfarbe ab Dezember/Januar	Tafelobst (Vermarktungs-Eignung)	Mitte bis Ende Oktober	Dezember/ Januar bis Mai	mittelstark bis stark	verträglich	robust gegen Mehltau und Krebs; etwas anfällig für Fruchtschorf, freistehend pflanzen, in zu rauen Lagen schlechte Frucht reife	mittelspät; guter Pollenspender	pyramidal, Zeige hängend; verlangt sorgfältigen Aufbau und gute Pflege, sonst kleine Früchte
Ontario	schöne, große, flachrunde, etwas gerippte, weißlich bis hellgelbe Spätwintersorte mit hohem Vitamin-C-Gehalt und rot verwaschener Färbung	erfrischende Säure mit schwachem Gewürz; knackig, fest; spät geerntete und gut gelagerte Früchte entwickeln einen interessanten süß-herben Geschmack	Tafelobst (Vermarktungs-Eignung), Kochsobst, Mostobst (z.B. reinsortig?!)	Ende Oktober bis Anfang November (bis zu den ersten Bodenfrösten)	Januar bis Mai	mittlere Größe, anfänglich kräftig bis mittelstark, im Vollertragsalter nur noch schwach	verträglich	mit Einschränkungen in Höhenlagen, sturmfeste Früchte; ggf. etwas Holzfrostgefahr (daher nur vorsichtige Stickstoffdüngung!)	mittelspät, teilweise selbstfruchtbar	hochoval, geht im Alter in die Breite; schwache Neigung zur Verzweigung, dadurch Gefahr der Verkahlung der unteren Astbereiche
Himbels Rambour	hellgelber, glänzender Apfel mit lebhaft rosa-roter Deckfarbe; Ursprung: Lokalsorte aus Schwaigen bei Murnau	mit zunehmender Lagerung/ Reife angenehm weinsäuerlich-süß	Wirtschaftsobst, (Tafelobst)	Oktober bis Anfang November (?)	Dezember bis April	stark	k.A.	extrem robust, gesund, auch in Westwindlagen kaum Fruchtfall	ziemlich spät	hochgebaut-kugelförmig
Birnensorten (nach Reifezeit und Haltbarkeit sortiert)										
Petersbirne	leuchtend gelb-rot gefärbte, kleine Frühbirne mit hellroten Streifen	saftig, süß, mit kräftigem Zimtaroma und dezenter Säure	Tafelobst (gut transportfähig), Nasskonserve, Dörrobst, Küche, Brennobst	Ende Juli bis Anfang August über 2 Wochen ausreifend	August (14-20 Tage lagerfähig, baumreif genussreif!)	stark	nicht relevant	robust, bis in Gebirgs- und Grenzlagen; Früchte windfest; wenig Schorf; ggf. lokal anfällig für Obstmade	lang, spät, wenig frostempfindlich	breitpyramidal mit schräg aufrecht wachsenden Gerüststäben; gut mit Seitenholz besetzt; nach Erziehung regelmäßig auslichten (wird sehr dicht!)
Josephine von Meckeln	relativ kleine hellgrüne, Frucht; eine der Winter-Lagerbirnen, die auf Grenz-Tafelbimstandorten ausreift	hochfeines süßweiniges Aroma, vollsaftig, vollschmelzend	Tafelobst, Küche	E10 - A11	Januar bis März (Lagerbirne)	schwach	nicht relevant	wenig krankheitsanfällig; (warme, windgeschützte Standorte fördern die Fruchtgüte); ggf. etwas Blattschorf; beachtlich resistent gegen Frost, Früchte sind windfest	mittelfrüh; guter Pollenspender	kleinkronig-breitpyramidal mit hängenden Ästen; trotzdem pflegeleicht
Bayerische Weinbirne	sehr große, glockenförmige Birnen mit hellgrüner bis leicht hellgelber Färbung	süß-saftig, herb mit angenehmer Würze, optimal zur Safttherstellung	Mostobst, Dörrobst, Brennobst, (Tafelobst)	Oktober	Oktober (ggf. bis November)	sehr stark, landschaftsprägender Charakter	nicht relevant	relativ feuerbrandresistent, gesund	mittelspät	landschaftsprägender Charakter
Zwetschgensorten										
Wangenheimer Frühzwetschge	runde, dunkel violettblaue Frucht mit hellblauer Bereifung und gelbgrünem Fruchtfleisch, gut steinlösend	wohlschmeckend honigsüß, saftig, leicht würzig mit edlem Zwetschgengeschmack	Tafelobst (gut transportfähig); Kuchen; Zwetschgenmus; Dörrobst	Ende August bis Mitte September	direkt	stark	nicht relevant	sehr robuste, gesunde Streuobstsorte für sonnige bis halbschattige Standorte; frosthart; (etwas anfällig für Pflaumenmade; geringe Scharka-Toleranz	spät; selbstfruchtbar; Befruchter: Ontariopflaume, The Czar	breite, z.T. überhängende Krone mit dichter Verzweigung

Sorte	Frucht	Geschmack	Verwendung	Pflückreife	Genußreife / Lagerdauer	Baumwuchs / Wuchsstärke	Verträglichkeit Apfelallergiker*	Anfälligkeit & Resistenzen	Blütezeit	Kronenform / spezielle Pflegemaßnahmen
Süßkirschensorten (Achtung: Fremdbefruchter!)										
Bütners Rote Knorpelkirsche	mittelgroße bis große, gelbrote Kirsche mit festem Fruchtfleisch und mäßig platzfester Schale	sehr süß-würzig, wohlschmeckend, mit leichter Säure	Tafelobst, Kompott, Gelee, Nasskonserve	mittelfrüh 5. Kirschoche (Anfang bis Mitte Juli)	direkt	stark	nicht relevant	sehr robust, anspruchslos, anpassungsfähig an unterschiedliche Standorte; wie andere gelbbunte Kirschen geringerer Befall durch Kirschessigfliege	mittelfrüh; guter Pollenspender; Befruchter: u.a. Burlat, Dönnissens Gelbe Knorpelkirsche	stark und aufrecht wachsende Krone mit guter Verzweigung; im Alter ausladende Krone
Maroni / Edelkastanie (Achtung: Fremdbefruchter! 2 Sorten benötigt)										
Precoce Migoule	große bis sehr große, hellmahagoni-farbige, gut schälbare Maroni	guter bis sehr guter Geschmack	Frischverzehr (gekocht/ geröstet), Mus, Backen (als Mehl)	früh (Ende September bis Anfang Oktober; gut für kühlere Lagen, auf denen späte Sorten oft nicht ausreifen)	mitteltute bis gute Haltbarkeit	mittelstark	nicht relevant	Blattrost-unempfindlich; anfällig für Späten Kastanienwickler, Fruchtfäule und Kastanienkrebs; bedingt spätfrost-verträglich (eigentlich früher frostempfindlicher Austrieb, bei Frostschaden folgt jedoch zweite Blüte aus Sekundär-Knospen; offene bzw. Ostwindlagen meiden)	früh; benötigt geeigneten Befruchter z.B. Vignols, Belle Epine, Marigoule, bzw. lang staubblättrige Castanea sativa-Sämlinge	sehr aufrecht, mäßig verzweigt; ggf. durch Schnitt im Wachstum anregen
Vignols	große bis sehr große, elliptische, hellbraune Früchte	süßer, feiner Geschmack	Frischverzehr (gekocht/ geröstet), Mus, Backen (als Mehl)	früh bis mittelspät (Anfang Oktober)	gute Haltbarkeit	stark	nicht relevant	resistent gegenüber Gallwespe; nicht sehr empfindlich für Rindenkrebs und Fruchtfäule; relativ viele taube Früchte; relativ früher Austrieb (offene bzw. Ostwindlagen meiden)	früh bis mittelfrüh; sehr guter Befruchter ; benötigt Befruchter z.B. Precoce Migoule	aufrecht, stark und regelmäßig verzweigt, eignet sich für Spindelform
Maulbeere										
Maulbeere Morus "Wellington"	große, dunkelrote, fast schwarze, brombeerähnliche Beeren mit instensiver Süße und feiner Säure	sehr gutes Aroma mit instensiver Süße und feiner Säure (an sonnigem, windgeschütztem Standort)	Tafelobst, Kochobst, Dörrobst	durchgängig von Juli/ August bis September	direkt	mittelstark bis stark (4 bis 6m)	nicht relevant	sehr robuste Sorte; i.d.R. winterhart (mit zunehmenden Alter erhöht sich auf die Frost-Widerstandsfähigkeit)	Mai bis Anfang Juni; Insektenweide	ausladende Baumkrone; ggf. Rückschnitt erfrorener Zweige bis in das gesunde Holz
Weiteres										
Paket "Mischung heimischer Wildsträucher" 30 Heister für ca. 10 Meter Hecke; Arten u.a. z.B. Berberitze, Kornelkirsche, Haselnuss, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Rote Heckenkirsche, Hundsrose, Kreuzdorn	—	—	Habitat, Deckung und Futterstätte für Kleinsäuger, Vögel und Insekten	—	—	—	—	k.A.	k.A.	Pflanzung dreireihig; Pflanzabstand 1 Meter zwischen den Reihen und 80 bis 100 cm in der Reihe; lichtbedürftige Arten in Randreihen, höhere Arten in der Mitte

Sorte	Frucht	Geschmack	Verwendung	Pflückreife	Genußreife / Lagerdauer	Baumwuchs / Wuchsstärke	Verträglichkeit Apfelallergiker*	Anfälligkeit & Resistenzen	Blütezeit	Kronenform / spezielle Pflegemaßnahmen
Stieleiche Quercus robur	—	—	Bienenweide, Insektenhabitat	—	—	sehr stark, bis zu 25 m Höhe	—	allgemein bodentolerant, anspruchslos und robust; verträgt sommerliche Trockenzeiten wie auch Überschwemmungen	April-Mai	ausladender Großbaum, der in der freien Landschaft bis zu 25 m Höhe erreichen kann
Sommerlinde Tilia platyphyllos	—	—	Bienenweide, Duft, Lindenblütentee, Schnitzholz	—	—	sehr stark, bis zu 35 m Höhe	—	k.A.	Juni	Lindenblattförmiger Habitus
Pfähle, Fichtenholz Länge 2,50m; als Pflanzpfahl bzw. für Bau Drei-/ Vierbock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wühlmauskorb Maße ca. 60x70cm verzinkt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pflanzung und Pflege von Streuobstbäumen — Naturgemäßer Obstbaumschnitt für die Praxis Broschüre, Deutscher Verband für Landschaftspflege	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Studie Berliner Charité & BUND Lemgo: https://www.bund-lemgo.de/download/00_Apfelallergie_Info_pdf_10_2020.pdf